

ଦୁର୍ଗ ଚାଷାଙ୍କ ଦାନାଖର୍ତ୍ତ କମାଇବା ପାଇଁ ବିକଳ୍ପ ଗୋ-ଖାଦ୍ୟ



ଆଜୋଲା

ଆଜୋଲା କଣ ?

ଆଜୋଲା ଏକ ଜୀବନ୍ତ ଭାସମାନ ଫର୍ମ ଜାତୀୟ ଉତ୍ତିଦ, ଯାହାକି ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଉପଲବ୍ଧ କରିଥାଏ । ଏଥରେ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣର ପୁଷ୍ଟିସାର, ଭିଟାମିନ୍ ଓ ଧାତବ ଲବଣ ମହଞ୍ଜୁଡ ଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ଉକ୍ତକୁ ଗୋଖାଦ୍ୟ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ । ଏହା ଏକ ଜଳଜ ଉଭିଦ । ଏହାର ଚେର ପାଣି ତଳକୁ ଓହଳିଥାଏ, ମାତ୍ର କାଣ୍ଠ ପାଣି ଉପରେ ସଫ୍ରସାରିତ ହୋଇ ବଢ଼ିଥାଏ । ପତ୍ରଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ଓ ଲକ୍ଷ୍ମେତ୍ର ଲାଲ ମିଶା ଶାରୁଆ ରଙ୍ଗର ।

ଆଜୋଲାକୁ କାହିଁକି ଗୋଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ?

୧. ଏଥରେ ଅଧିକ ପୁଷ୍ଟିସାର ଓ କମ ତନ୍ତ୍ରଜାତୀୟ ଲିଗନିନ ଥିବାରୁ ଏହା ଗାଇଗୋରୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହଜରେ ହଜମ ହୋଇଥାଏ ।
୨. ଆଜୋଲାରେ କମ ପରିମାଣର ଶ୍ରେତସାର ଓ ସ୍ଵେହସାର ଥାଏ ।
୩. ଏଥରେ ଥିବା ଖାଦ୍ୟ ସାର ଗାଇ ମଇଷ୍ଟିଙ୍ ପାଇଁ ସର୍ବୋକୃଷ୍ଣ ଗୋଖାଦ୍ୟ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ ।
୪. ଏହା ଖୁବ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧିପାଏ ଓ ଉପାଦନ ସ୍ଵର୍ଗ ବ୍ୟୟ ସାପେକ୍ଷ ଅଟେ ।
୫. ୧.୪ କି.ଗ୍ରା.ରୁ ୨ କି.ଗ୍ରା. ଆଜୋଲା ଦୈନିକ ଦାନାରେ ମିଶାଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ, ଗାଇଙ୍ ଦୁର୍ଗ ଉପାଦନ ଶତକଢ଼ା ପ୍ରାୟ ୧୫ ଭାଗ ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ ।

ଆଜୋଲା ଖାଇବାକୁ ଦେବାର ପ୍ରଶାନ୍ତି:

୧. ଆଜୋଲାକୁ କୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ଚାଲୁଣୀ କିମ୍ବା ଜାଲିଥିବା ଛଣା ଦ୍ୱାରା ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ।
୨. ଏହା ପରେ ତାହାକୁ ସ୍ଵଳ୍ପ ପାଣିରେ ଭଲ ଭାବରେ ହୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ ।
୩. ପାଣି ନିରିତି ଗଲା ପରେ ଗୋଖାଦ୍ୟ ସହ ମିଶାଇ ଗାଇ କିମ୍ବା ମଇଷ୍ଟିକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ।

ଆଜୋଲାର ଚାଷ ପ୍ରଶାନ୍ତି:

ପ୍ରଥମେ ୨ ମିଟର ଲମ୍ବ, ୨ ମିଟର ଚତୁର୍ଭାବ ୩ ଓ ୨୦ ସେ.ମି. ଗଭାରର ଏକ ସିମେଣ୍ଟ କୁଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ । ଏଥରେ ୧୦-୧୭ କି.ଗ୍ରା. ଦୋରସା ଉର୍ବର ମାଟି ସମାନ ଭାବରେ ପକାନ୍ତୁ । ତାପରେ ୨ କି.ଗ୍ରା ସତା ଗୋବର ଓ ୩୦ ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଳ ସୁପର ଫର୍ମପେଟ ସାରକୁ ୧୦ ଲିଟର ପାଣିରେ ଗୋଲେଇ ଉଚ୍ଚ କୁଣ୍ଡରେ ପକାନ୍ତୁ । ପାଣି ଶ୍ରରର ଉଜତା ୧୦ ସେ.ମି. ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୁଣ୍ଡରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତା କରନ୍ତୁ । ଏହାପରେ ୫୦୦ ଗ୍ରାମରୁ ୧ କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୋଲା କଲଚର ଏହି ପାଣି କୁଣ୍ଡରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ । ଏହାର ୧୦-୧୫ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଆଜୋଲା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭରି ହୋଇଯିବ । ଏଥରୁ ଦୈନିକ ପ୍ରାୟ ୧ କି.ଗ୍ରା. ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜୋଲା ଅମଳ କରିବେ । ପ୍ରତି ୭ ଦିନ ଅନ୍ତରରେ ୨୦ ଗ୍ରାମ ସିଙ୍ଗଳ ସୁପର ଫର୍ମପେଟ ପକାଇଲେ ଆଜୋଲା ଖୁବ ଶାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହେବା ସହିତ ଅଧିକ ଆଲୋଜା ଆମଦାନି ହୋଇବାରିବ । ଏଥରେ ଓମଫେଟ ମିନେରାଲ ମିକ୍ରଚର ୩୦-୩୫ ଗ୍ରାମ ପ୍ରତି ସପ୍ତାହ ଅନ୍ତରରେ କୁଣ୍ଡରେ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ଏହା ଆଜୋଲାର ବୃଦ୍ଧି ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ।

ଅଧିକ ଆଜୋଲା ଉପାଦନର ଉପାୟ:

୧. ଅଧିକ ଆଜୋଲା ଉପାଦନ ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆଜୋଲା ଅମଳ କରିବା ଦରକାର ।
୨. ଆଜୋଲା କୁଣ୍ଡର ଉତ୍ତାପ ୨୪-୩୦ ଟିଗ୍ରେନ୍ଡ୍ରିଗ୍ରେଡ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଦରକାର । ତେଣୁ ଛାଇ ମୁନ୍ଦ ଓ ପରୋକ୍ଷ ଭାବରେ ସ୍ଥର୍ଯ୍ୟକିରଣ କୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିଲେ ଭଲ ।
୩. କୁଣ୍ଡର କ୍ଷାରୀୟ ଅମଲା ୫.୫ ରୁ ୭.୦ ଭାଗ ମଧ୍ୟରେ ରହିବା ଭଲ ।
୪. ଆଜୋଲାକୁ ପୋକ ଓ କାଟ ଦାଉରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମଣ୍ଡିରେ ନିମ୍ନ ପିଡ଼ିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ ।