

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଡେନ୍ଦରା ଯୋଜନା - ଏ ଆମ୍ବୁକୁଳ୍ୟରେ



କୃମି ନିରାକରଣ

- କୃମି ନିରାକରଣ ସାଧାରଣତଃ ବୟସ ଗାଇ, ବାଛୁରୀ ଓ ଛଡ଼ାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିହାତି ଜରୁରୀ।
- ଗାଇର ଶରୀରରେ ଥିବା କୃମି ଗୁଡ଼ିକ ଗାଇ ଖାଉଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ନିଜେ ଖାଇ ଦିଅନ୍ତି।
- କୃମି ହେବାଦାରା ଗାଇର ପେଟ ଫୁଲିଯାଏ, ତରଳ ଖାଡ଼ା ହୁଏ, ଲୋମ ଗୁଡ଼ିକ ଉଠିଯାଏ ଓ ଅସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥାଏ।
- ଦୁର୍ଗୁ ଉପାଦନ କମିଯାଏ।
- ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା କମିଯାଏ।
- ଶରୀରର ଉପଯୁକ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ନାହିଁ।
- ଗର୍ଭଧାରଣ କ୍ଷମତାବିଳମ୍ବରେ ଆସିଥାଏ।
- ପୁନର୍ବାର ଗର୍ଭଣୀ ହେବାରେ ବିଳମ୍ବ ଓ ଅନିଯମିତତା ଦେଖାଯାଏ।

ପ୍ରତିରୋଧକ ବ୍ୟବସ୍ଥା :

- ନବଜାତ ବାଛୁରୀକୁ ଜନ୍ମର ୧୦ ଦିନ ପରେ ପ୍ରଥମ ଖୁରାକ ଓ ପ୍ରତି ତିନିମାସରେ ଥରେ ଏକ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୃମି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।
- ଗାଇ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତି ୩ ମାସରେ ଥରେ କୃମି ଔଷଧ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ।

ଟୀକାକରଣ

- ଗାଇ ଗୋରୁ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତଣ୍ଡିଫୁଲା, ବଜବଜିଆ ଯେପରି ଏକ ମାରାତ୍ତକ ରୋଗ ଠିକ୍ ସେପରି ପାଚୁଆ ରୋଗ ବାଛୁରୀ ମୃତ୍ୟୁ ତଥା ଗାଇମାନଙ୍କ ଦୁର୍ଗୁ ଉପାଦନ ହ୍ରାସ ହେବାର ଏକ ମୂଖ୍ୟ କାରଣ।
- ଏହି ରୋଗର ଜୀବାଣୁ ଓ ଭୂତାଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ସାଧାରଣତଃ ଗାଇ ରହୁଥିବା ପରିବେଶରେ ଥିବାରୁ ଏହା ଗାଇକୁ ସହଜରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରିଥାଏ।
- ଟୀକାକରଣ ଦ୍ୱାରା ପଶୁର ଶରୀରରେ ଜୀବାଣୁ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ।
- ଟ୍ରାଓଭେକ୍ (ଓଷଧ) ତଣ୍ଡିଫୁଲା, ବଜବଜିଆ ଓ ପାଚୁଆ ତିନୋଟି ଯାକ ରୋଗ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଟୀକା।
- ଏହି ଟୀକା ପଶୁ ଶରୀରରେ ପ୍ରାୟ ୧୧ ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥାଏ।
- ଏହି ଟୀକା ବର୍ଷାରତ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ପଶୁ ମାନଙ୍କୁ ଦେବା ଉଚିତ୍।
- ସୁସ୍ଥିତାବଳ ପଶୁକୁ ଟୀକାକରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପଶୁ ଶରୀରରେ ବେଶୀ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇଥାଏ।

ସୌଜନ୍ୟ :

ମମଲେଖୁରୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ମମବାନ୍ ଦୁର୍ଗୁ ଉପାଦକ ଫଂଦ
ମମଲପୁର

